

- Գրգռիչ թունավոր նյութեր (օր. ֆորմալին) կուլ տալու դեպքում խմեցնել որևէ պարուրող նյութ (օր. օսլայի մածուկ): Չի կարելի տալ կաթ, ճարպեր, ալկոհոլային խմիչքներ:
- Մաշկային արյունահոսության դեպքում՝ դնել ջրածնի գերօքսիդով թրջած տամպոններ:
- Զթային արյունահոսության դեպքում դնել սառը թրջոցներ քթարմատին եւ ծոծրակին, իսկ քթի մեջ՝ ջրածնի գերօքսիդով կամ խիտ աղային լուծույթով թրջած տամպոններ:

Թունաքիմիկատներով աշխատելու վայրում ցանկալի է ունենալ առաջին մինչբուժական օգնության դեղատուփ: Թունաքիմիկատներով մշտապես աշխատողներին առաջարկվում է անցնել նախնական բուժզննում:




Սույն հրատարակությունն իրագործվել է «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» հասարակական կազմակերպության կողմից, «ԿՕՒ-ների և թունավոր քիմիկատների բացասական ազդեցության մասին իրազեկության բարձրացում Հայաստանի ծրագրային գյուղերում՝ ուսկերի նվազեցման համար» ծրագրի շրջանակներում, Հայաստանում ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի և Հովանոցային արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ՝ ELA ծրագրի շրջանակներում, «Եվրոպայի կանայք հանուն ընդհանուր ապագայի» միջազգային կազմակերպության միջոցով:



«Հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակա միջավայրի»
Հասարակական կազմակերպություն

375019, ՀՀ, ք. Երեւան
Բաղրամյան պող. 24դ, սենյակ 609
Հեռ: (+374-1)-52 36 04
E-mail: office@awhhe.am
URL: www.awhhe.am



**Առաջին օգնությունը
թունավորման դեպքում**

www.awhhe.am
ԵՐԵՎԱՆ 2004



Առաջին օգնությունը թունավորման դեպքում

Թունաքիմիկատների ոչ ճիշտ օգտագործման դեպքում հնարավոր են տարբեր տեսակի թունավորումներ: Թունավորման բոլոր դեպքերում անկախ ծանրությունից պետք է անհապաղ դիմել բժշկի կամ բուժակի՝ տրամադրելով նրանց թունաքիմիկատի պիտակին նշված լրիվ տեղեկատվությունը:



Առաջին օգնությունը ներառում է այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կարող են կատարել իրենք՝ թունաքիմիկատներով աշխատողները (ինքնօգնություն, փոխօգնություն) եւ բուժաշխատողները (հատուկ միջոցառումներ):

- Տուժածին ազատել շնչառությունը դժվարացնող հագուստից:
- Չգուշությամբ հանել հիվանդի աղտոտված հագուստը եւ շնչադիմակը:
- Ընչուղիներով թունավորման դեպքում տուժածին հանել վտանգավոր գոտուց, ապահովել մաքուր օդի մուտքը:



- Ընչառության թուլացման դեպքում տուժածի քթին մոտեցնել անուշադրի սպիրտ /նաշատիր/:
- Ընչառության դադարի դեպքում անմիջապես կատարել արհեստական շնչառություն, նախօրոք լորձից մաքրելով բերանի խոռոչը եւ դուրս հանելով կուլ գնացած լեզուն:
- Մաշկային թունավորման դեպքում լաթի կտորով զգուշորեն հեռացնել թունաքիմիկատը մաշկի վրայից, ապա լվանալ առատ սառը ջրով, հիմնային լուծույթով կամ օճառով:
- Աչքերի մեջ ընկնելու դեպքում լվանալ առատ ջրով, խմելու սողայի կամ բորաթթվի լուծույթով:
- Աղետամոքսային տրակտի թունավորման դեպքում խմեցնել մի քանի բաժակ ջուր (ցանկալի է գուլ) կամ մանգանա-կալիական թույլ վարդագույն լուծույթ:
- Ըմպանի ետին պատը գրգռելով առաջացնել փսխում, կրկնել այս գործողությունը 2-3 անգամ: (Զի կարելի փսխում առաջացնել հիվանդի մոտ, որը անգիտակից վիճակում է կամ ջղաձգության համախտանիշ ունի:)
- Ջղաձգումների դեպքում ապահովել տուժածի լիակատար հանգիստը՝ բացառելով ամեն տեսակ գրգռվածություն: